

## 5.ทันตกรรมปริทันต์



เหงือกเป็นส่วนหนึ่งของอวัยวะปริทันต์ที่ทำหน้าที่ยึดฟันไว้ในกระดูกขากรรไกร และรองรับแรงในการบดเคี้ยว เหงือกปกติจะมีสีชมพู ขอบเรียบ ไม่บวม ไม่มีเลือดออก

โรคเหงือกอักเสบเป็นโรคที่เกิดขึ้นในประชากรถึงร้อยละ 80 โดยปกติจะไม่มีอาการ ลักษณะของโรคเหงือกอักเสบคือ เหงือกมีสีแดง อาจจะมี บวมเล็กน้อย

ที่พบมากที่สุดจะมีเลือดออกขณะแปรงฟัน ซึ่งคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าเกิดจากการแปรงฟันแรงหรือใช้ขนแปรงที่แข็งเกินไป การรักษาโรคเหงือกอักเสบด้วยการขูดหินปูน ควรได้รับการขูดหินปูนทุก ๆ 6-12 เดือน

โรคเหงือกอักเสบหากทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการรักษา จะกลายเป็น “โรคปริทันต์อักเสบ” (สมัยก่อนเรียกว่า โรครำมะนาด) โดยเริ่มมีเหงือกแดง บวมเล็กน้อยถึงปานกลาง และมีเลือดออกขณะแปรงฟัน เมื่อโรคลุกลามมากขึ้นอาจจะพบ เหงือกร่น ฟันโยกหรือฟันเคลื่อนที่ผิดไปจากตำแหน่งเดิม การมีหนองและกลิ่นปาก หรือเหงือกบวมใหญ่จน ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการสูญเสียฟันในวัยผู้ใหญ่

การรักษาโรคปริทันต์อักเสบ โดยการขูดหินปูน ร่วมกับการเกลารากฟัน ซึ่งอาจจะต้องมาทำการรักษาทุก ๆ 3-6 เดือน